

LAVEMENT BARYTÉ

Avant de débuter la préparation, vous devez vous procurer à la pharmacie :

- Picosalax (1 boîte)
- Bisacodyl (5mg – 4 comprimés)

DIÈTE LIQUIDE À PARTIR DE 6H A.M. LA VEILLE DE L'EXAMEN

LIQUIDES PERMIS :

- Eau, jus de fruits sans pulpe.
- Ensure ou équivalent sans fibre (Vanille seulement)
- Thé – Café (sans lait) en quantité limitée. Sucre ou miel permis.
- Jello clair, Popsicle clair
- Bouillon ou consommé clair

INSTRUCTIONS POUR LA PRISE DES LAXATIFS

| | |
|-----------------|--|
| Déjeuner | <ul style="list-style-type: none"> • Dissoudre le premier emballage de Picosalax dans un verre d'eau froide en brassant pendant 2 à 3 minutes. Boire le mélange. Par la suite, boire 4 à 5 verres de liquide clair dans l'heure qui suit. |
| Dîner | <ul style="list-style-type: none"> • Prendre 2 comprimés de Bisacodyl (Dulcolax) 5mg avec 1 verre d'eau liquide clair. |
| 17H00 | <ul style="list-style-type: none"> • Prendre le deuxième emballage de Picosalax et le préparer comme le premier. Boire 1 verre d'eau chaque 10 minutes pendant une heure. Les selles doivent devenir liquides, de couleur clair ou jaune pâle et sans solide. |
| 21h00 | <ul style="list-style-type: none"> • Prendre 2 comprimés de Bisacodyl 5mg. |
| Minuit | <ul style="list-style-type: none"> • Être à jeun à partir de minuit. |

IMPORTANT : Si vous avez des médicaments à prendre, prenez-les avec une gorgée d'eau.

La qualité de votre examen dépend grandement de la qualité de votre préparation. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, assurez-vous de suivre cette diète à la lettre. Ne faites pas de changement ou de substitution sans l'accord de votre médecin.

IMPORTANT : **SI VOUS ÊTES DIABÉTIQUE ET PRENEZ DE L'INSULINE, SVP, AVISEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE DÉBUTER LA PRÉPARATION AFIN D'AJUSTER VOS DOSES D'INSULINE.**